

Cleft and Craniofacial Center -

- ³/₄ Si su hijo tiene más que una molestia leve, el médico podría recetarle un medicamento para ayudarlo a dolor. Administre el medicamento para el dolor tal y como lo recetó e indicó el médico y el personal de enfermería.
- ³/₄ Trate de programar una ~~do~~ del medicamento para el dolor alrededor de la hora de dormir, en especial durante los primeros días en casa. Esto ayudará a que su hijo duerma mejor.

Estreñimiento

- ³/₄ Lleve un seguimiento de los hábitos de evacuación de su hijo. Debe regresar a ~~de~~ su evacuación anteriores. Si no lo hace, podría tener estreñimiento.
- Llame al pediatra de su hijo o al equipo de cirugía plástica si piensa que su hijo tiene estreñimiento.

Cuidado de la piel y las heridas

- ³/₄ La incisión se cierra con suturas reabsorbibles que no será necesario quitar. El médico colocará sobre las s una capa de pegamento para la piel (Dermabond). No se necesita ningún cuidado de la incisión, y el pegam para la piel se saldrá por su cuenta, generalmente dentro de ~~de~~ ^{de} 7 a 14 días.
- ³/₄ Puede bañar a su hijo en la tina. El labio se puede mojar, pero no frote el área.