

Rochester, NY 420

piso)

Se le notificará con antelación si está previsto que se le administre sedación o anestesia.

- * Puede consumir una comida ligera 6 horas antes del procedimiento. Puede beber líquidos claros hasta 2 horas antes del procedimiento (p. ej.: jugo claro [manzana, arándano blanco, uva blanca/SIN PULPA], café negro con azúcar (sin crema), ginger ale, agua).
- * estar acompañado de un adulto que le lleve a casa después de la sigmoidoscopia flexible, si esta se realiza con sedación o anestesia. Si tiene previsto tomar el autobús o un taxi, deberá ir acompañado de un adulto. No puede conducir ni trabajar por lo menos hasta el día siguiente.
Recomendamos enfáticamente que su acompañante permanezca en el centro durante todo el procedimiento.
- * *Debe realizarse una prueba de la COVID-19 no antes de 5 días pero a más tarde 4 días antes de su sigmoidoscopia flexible, si esta se realizará con sedación o anestesia.* Vaya a cualquiera de los centros de pruebas de la COVID-19 del URMC realizadas antes de los procedimientos de la lista proporcionada.

CONSEJOS ÚTILES

- * **Quítese y deje todas las joyas en casa.**
- * **Deje todas sus pertenencias de valor en casa.**
- * **Traiga su identificación con foto y la tarjeta del seguro médico.**
- * **Deberá permanecer en el Centro de Cirugías** . Aunque su médico se esfuerza por ser puntual, a veces surgen inconvenientes que pueden provocar un atraso en la hora de inicio del procedimiento. Agradecemos su flexibilidad y haremos todo lo posible para evitar cualquier demora.
- * **Un enfermero le llamará para revisar su historial médico y sus medicamentos antes del procedimiento**
- * **Las toallitas húmedas desechables en el inodoro pueden ayudar a aliviar el dolor causado por las deposiciones frecuentes**
- * **Recomendamos enfáticamente que su acompañante permanezca en el centro durante el procedimiento para que pueda hablar con el proveedor que lo realiza.**